



Dipartimento di Prevenzione
UOSD Prevenzione Collettiva – Ambito 3
Via Nilde Iotti n. 19 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Tel. 081 1843.6127 – 6099 – 6014
Email: uopc3@aslnapoli3sud.it - PEC: uopc3@pec.aslnapoli3sud.it

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale 2° MASSAIA
via Flotard de Lauzieres 8/38 San Giorgio a Cremano
naic8fe00q@pec.istruzione.it

Oggetto: informativa per caso accertato di Varicella -

Scuola secondaria di I grado, [REDACTED]

A seguito di segnalazione di un caso di Varicella presso codesto istituto, riteniamo utile fornire alcune informazioni relative alla malattia. La varicella è una malattia infettiva molto contagiosa, trasmessa per via aerea mediante goccioline respiratorie che si diffondono soprattutto in ambienti chiusi, quando una persona starnutisce o tossisce, o tramite contatto diretto con le lesioni cutanee.

Colpisce maggiormente bambini e giovani adolescenti ed è causata dall'infezione primaria del virus varicella-zoster (famiglia degli Herpes viridae).

Il periodo di incubazione della malattia è di 10 – 21 giorni, con sintomi caratterizzati da febbre bassa e malessere, seguiti da un esantema cutaneo.

L'esantema, costituito da papule rosa pruriginose che diventano vescicole con liquido chiaro e poi croste, inizia su testa e viso, per poi diffondersi al tronco e agli arti.


La contagiosità dura dai 5 giorni prima fino a 5 giorni dopo la comparsa delle vescicole.

La varicella è solitamente benigna e guarisce in 7-10 giorni, conferendo immunità permanente.

La vaccinazione è l'unica forma di prevenzione, come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, è consigliata nei bambini più grandi, negli adolescenti e negli adulti che non sono stati mai vaccinati e che non abbiano ancora contratto la malattia, nelle persone che per motivi professionali hanno un maggior rischio di acquisire l'infezione (come il personale scolastico), nelle donne in età fertile che non hanno già avuto la malattia, per evitare un'eventuale infezione in gravidanza e i conseguenti danni al bambino.

Pertanto si raccomanda di informare il personale scolastico interessato e le famiglie della classe e sezione coinvolta di rivolgersi tempestivamente al medico curante qualora dovessero insorgere febbre, esantema o altri sintomi compatibili nei 21 giorni successivi all'ultima esposizione e/o di considerare la profilassi vaccinale.

Per la scuola sono previste le ordinarie misure igieniche e l'aerazione degli ambienti.



Il Responsabile UOSD 3
Dr. V. Montella